

Espèces	Hauteur à maturité [m]	Vitesse de croissance	Préférence du sol	Epineux	Mellifère	Toxicité	Médicinal	Sensible au feu bactérié	Tendance au rejet
Hauteur jusqu'à 1 m:									
Rosier des champs (<i>Rosa arvensis</i>)	1		Moyennement humide	X					
Genêt des teinturiers (<i>Genista tinctoria</i>)	1		Moite				X		
Groseillier à maquereau (<i>Ribes uva-crispa</i>)	1		Moyennement humide	X			X		
Groseillier des Alpes (<i>Ribes alpinum</i>)	1		Moyennement humide	X					
Hauteur 1.5-2.5 m:									
Chèvrefeuille noir (<i>Lonicera nigra</i>)	1.5		Moyennement humide						
Hippocrépide buissonnante (<i>Hippocrepis emerus</i>)	1.5		Moyennement sec						
Genêt à balais (<i>Cytisus scoparius</i>)	1.5		Moite						
Chèvrefeuille des haies (<i>Lonicera xylosteum</i>)	2		Moyennement humide						
Buis (<i>Buxus sempervirens</i>)	2		Moyennement sec				X		
Rosier à feuilles rugueuses (<i>Rosa rugosa</i>)	2.5		Moyennement sec	X					
Argousier (<i>Hippophaë rhamnoides</i>)	2.5		Moite	X					X

Espèces	Hauteur à maturité [m]	Vitesse de croissance	Préférence du sol	Epineux	Mellifère	Toxicité	Médicinal	Sensible au feu bactérien	Tendance au rejet
Hauteur 3-5 m:									
Amélanchier (<i>Amelanchier ovalis</i>)	3		Moite						
Epine-vinette (<i>Berberis vulgaris</i>)	3		Moyennement sec	X			X		
Rosier glauque (<i>Rosa glauca</i>)	3		Sec	X					
Prunelier (<i>Prunus spinosa</i>)	3		Moite	X			X		X
Nerprun purgatif (<i>Rhamnus cathartica</i>)	3		Moite	X			X		
Bourdainie (<i>Frangula alnus</i>)	3		Humide				X		
Saule pourpre (<i>Salix purpurea</i>)	4		Large amplitude						
Aubépine (<i>Crataegus monogyna</i>)	4		Moyennement humide	X			X		
Baguenaudier (<i>Colutea arborescens</i>)	4		Moyennement sec				X		
Cornuiller sanguin (<i>Cornus sanguinea</i>)	4		Moyennement humide						X
Rosier des chiens (<i>Rosa canina</i>)	4		Moite	X			X		

Espèces	Hauteur à maturité [m]	Vitesse de croissance	Préférence du sol	Épineux	Mellifère	Toxicité	Médicinal	Sensible au feu bactérien	Tendance au rejet
Néflier (<i>Mespilus germanica</i>)	4		Moyennement sec	X					
Sureau à grappes (<i>Sambucus racemosa</i>)	4		Moyennement humide				X		
Troène (<i>Ligustrum vulgare</i>)	4		Moite						
Viorne obier (<i>Viburnum opulus</i>)	4		Humide				x		
Cornuiller mâle (<i>Cornus mas</i>)	5		Moite						
Fusain d'Europe (<i>Euonymus europaeus</i>)	5		Humide				X		
Genévrier commun (<i>Juniperus communis</i>)	5		Sec	X			X		
Viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i>)	5		Moyennement sec						
Noisetier (<i>Corylus avellana</i>)	5		Moyennement humide						

Hauteur 6-8 m:									
Houblon (<i>Humulus lupulus</i>)	6		Détrempé				X		
Merisier odorant (<i>Prunus mahaleb</i>)	6		Sec				X		

Espèces	Hauteur à maturité [m]	Vitesse de croissance	Préférence du sol	Epineux	Mellifère	Toxicité	Médicinal	Sensible au feu bactérien	Tendance au rejet
Sureau noir (<i>Sambucus nigra</i>)	7		Humide				X		
Aubour commun (<i>Laburnum anagyroides</i>)	7		Moite						
Aubour des alpes (<i>Laburnum alpinum</i>)	7		Moyennement humide						
Clématite blanche (<i>Clematis vitalba</i>)	8		Moyennement humide						
Saule des vanniers (<i>Salix viminalis</i>)	8		Très humide						

Hauteur 9-15 m:									
Saule des chèvres (<i>Salix caprea</i>)	9		Humide						
Houx (<i>Ilex aquifolium</i>)	10		Moite						
Mérisier à grappe (<i>Prunus padus</i>)	10		Humide						X
Erable à feuilles d'obier (<i>Acer opalus</i>)	10		Moyennement sec						
Griottier (<i>Prunus cerasus</i>)	10		Moyennement humide						

Espèces	Hauteur à maturité [m]	Vitesse de croissance	Préférence du sol	Epineux	Mellifère	Toxicité	Médical	Sensible au feu bactérien	Tendance au rejet
Pommier sauvage (<i>Malus sylvestris</i>)	10		Moyennement humide	X					
Aulne blanc (<i>Alnus incana</i>)	12		Très humide						
Alisier blanc (<i>Sorbus aria</i>)	15		Moyennement sec						
Erable champêtre (<i>Acer campestre</i>)	15		Moite						
Sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i>)	15		Moyennement humide						

Hauteur supérieur à 15 m:									
Sorbier domestique (<i>Sorbus domestica</i>)	18		Moyennement humide						
Chêne pubescent (<i>Quercus pubescens</i>)	20		Moite						
If commun (<i>Taxus baccata</i>)	20		Moite						
Poirier sauvage (<i>Pyrus pyraster</i>)	20		Moyennement sec	X					
Alisier torminal (<i>Sorbus torminalis</i>)	20		Moyennement sec						
Aulne glutineux (<i>Alnus glutinosa</i>)	20		Détrempé						

Espèces	Hauteur à maturité [m]	Vitesse de croissance	Préférence du sol	Epineux	Mellifère	Toxicité	Médicinal	Sensible au feu bactérien	Tendance au rejet
Bouleau pubescent (<i>Betula pubescens</i>)	20		Très humide						
Saule blanc (<i>Salix alba</i>)	20		Détrempé						
Charme commun (<i>Carpinus betulus</i>)	20		Moyennement humide						
Lierre (<i>Hedera helix</i>)	20		Moyennement humide				X		
Bouleau pendant (<i>Betula pendula</i>)	25		Humide				X		
Erable plane (<i>Acer platanoides</i>)	25		Moyennement humide						
Merisier (<i>Prunus avium</i>)	25		Humide						
Noyer (<i>Juglans regia</i>)	25		Moite						
Orme champêtre (<i>Ulmus minor</i>)	25		Humide						
Erable sycomore (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	30		Humide						
Orme montagnard (<i>Ulmus glabra</i>)	30		Humide						
Peuplier noir (<i>Populus nigra</i>)	30		Humide						

Espèces	Hauteur à maturité [m]	Vitesse de croissance	Préférence du sol	Epineux	Mellifère	Toxicité	Médicinal	Sensible au feu bactérien	Tendance au rejet
Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata</i>)	30	(slow)	Moite		(high)				
Châtaignier (<i>Castanea sativa</i>)	35	(slow)	Moyennement humide		(medium)	(toxic)			
Chêne sessile (<i>Quercus petraea</i>)	35	(slow)	Moyennement sec		(medium)				
Peuplier blanc (<i>Populus alba</i>)	35	(fast)	Humide		(high)				
Pin sylvestre (<i>Pinus sylvestris</i>)	40	(slow)	Sec		(high)		X		
Tilleul à larges feuilles (<i>Tilia platyphyllos</i>)	40	(fast)	Moyennement humide		(high)		X		
Chêne pédonculé (<i>Quercus robur</i>)	50	(slow)	Humide		(medium)				
Sapin blanc (<i>Abies alba</i>)	60	(slow)	Très humide		(high)				